

Seminar des Querschnittsbereiches 8- Notfallmedizin

Sabahat Celik

Fallvorstellung



- Einsatz:
17.06.2005-
19.06.2005
- Deutsches Rotes
Kreuz
Nordwestzentrum

Meldebild



- 19.06.2005
13:38
- Suizidversuch

Situation vor Ort



- junge Frau
- Wohnung der Eltern
- Suizid-
/Abtreibungsversuch
- Tabletten der Oma
eingenommen

Maßnahmen vor Ort

- ABCD?????
- Was? Wann? Wie viel? Wie?
- Beipackzettel
- Giftnotrufzentrale Mainz

„W-Daten“



- 10-12 Tabl.
LEXOTANIL 6mg +
2 Tabl. Paracetamol
- Benzodiazepin
- strenge
Indikationsstellung
in der SS

Giftinfo Mainz



- Giftnotruf:
+49 6131 19240
oder
+49 700-GIFTINFO
- Infoline:
+49 6131 232466

Untersuchung



- Atmung: unauffällig
- RR: 120/80
- Puls: 90
- BZ: 99mg/dl
- Pupillenweite: mittel
- GCS: 14-15
- Bewußtsein: getrübt, schläfrig

Anamnese



- 21 Jahre alt
- verheiratet
- Streit mit Ehemann
- Fehlgeburt vor 6 Monaten
- erneute SS: 6-7 SSW

Maßnahmen im RTW



- SA O₂: 98%
- O₂-Gabe 4 l /min
- EKG: SR
- Periph.-venöser Zugang
- Ringer-Lsg 500 ml

Übergabe in der Klinik



- Internistische Station
- „W-Daten“:
 - Was?
 - Wann?
 - Wie viel?
 - Wie?

Klinische Erstversorgung



- Infusion
- Blutentnahme
- Überwachung
- Symptomatische Behandlung
- Kein Antidot, keine Magenspülung, keine Aktivkohle

Benzodiazepine

- große therapeut. Breite
- geringe Toxizität
- tödliche Intoxikationen selten
- Hypo-/Areflexie, Bewusstseinstörung, Ateminsuffizienz, Muskelschwäche, Übelkeit, Erbrechen
- Bromazepam **HWZ 20h**

Flumazenil(Anexate)

- Antidot
- kürzere **HWZ 50 min** → Überwachung
- nur bei schwerer Symptomatik
- initial 0,2mg als Bolus i.v.,
dann 0,1mg/min i.v. bis Pat. wach wird
bzw. bis max. Dosis 1mg

Vielen Dank!